

ODSTRANĚNÍ GENITÁLNÍCH BRADAVIC (KONDYLOMAT)

INFORMACE O ZÁKROKU PRO PACIENTY

Co tento zákrok obnáší?

Jedná se o chirurgickou léčbu genitálních bradavic-kondylomat v oblasti penisu. Odstranění se obvykle provádí ostrou lžičkou s následným popálením spodiny vysokofrekvenčním elektrickým proudem (prevence krvácení i opakování výskytu ve stejném místě).

Výkon se běžně provádí ambulantně v celkové narkóze, ale je možné jej provést i při krátkodobé hospitalizaci.

Jaké jsou alternativy tohoto zákroku?

- Využití lokální aplikace masti s Podofyllinem, kryodestrukce (zmrazení) tekutým dusíkem.

Co bych měl před tímto zákrokem očekávat?

Pokud pravidelně užíváte Anopyrin, Clopidogrel, Warfarin apod., musíte o tom informovat ošetřujícího lékaře. Tyto léky mohou způsobit zvýšené krvácení během operace i po operaci, pokud nejsou včas vysazeny. V některých případech je nutné tyto léky nahradit injekčními preparáty. O této eventualitě je nutné se poradit s vaším praktickým lékařem či kardiologem. Z důvodu výkonu v celkové narkóze si předem, na žádost objednavajícího lékaře, zajistíte předoperační vyšetření, na kterém je zhodnocen váš celkový stav, provedená laboratorní a přístrojová vyšetření. Souhlasný závěr zprávy s provedením indikovaného výkonu je nezbytnou podmínkou pro přijetí k hospitalizaci. Chybějící či neúplné předoperační vyšetření bude důvodem k odmítnutí provedení operace v objednaném termínu. Po přijetí sestrou vás navštíví člen lékařského týmu, který dokončí vaše vyšetření a zhodnotí vaši způsobilost k operačnímu výkonu. Budete požádáni, abyste minimálně 6 hodin před operací nejedli a nepili!

Nezapomeňte svého lékaře před operací informovat o možných následujících faktech:

- umělá srdeční chlopeň
- stent koronární arterie
- kardiostimulátor
- umělý kloub
- umělý cévní štěp
- neurochirurgický by-pass
- jiné implantované cizí těleso
- užívání následujících léků na předpis: Acylpyrin, Anopyrin, Aspirin, Godasal, Clopidogrel, Plavix, Kardegic, Aspegic, Micristin, Ibustrin, Ticlid, Tagren, Ipaton Apo-Tic, Plavix, Persantin, Curantyl, Anturan, Aggrenox, Vessel due F.
- alergie lékové i jiné
- jakékoliv abnormality či eventuality

O užívání léků ovlivňujících srážlivost krve je NUTNÉ informovat lékaře ještě před příjmem k zákroku.

Co se bude v průběhu operačního zákroku dít?

Výkon je prováděn v celkové anestezii. Ostrou lžičkou jsou odstraněny jednotlivé bradavice a jejich spodina je potom popálena vysokofrekvenčním proudem. Po ukončení výkonu je na jednotlivé rány nanášena vrstvička masti s antibiotikem. Odstraněné bradavice se někdy (v případě nejednoznačné diagnózy) odesílají k histologickému vyšetření.

Operace trvá dle rozsahu postižení přibližně 15 - 30 minut.

Co se bude dít bezprostředně po zákroku? Probudíte se na dospávací jednotce, která je zaměřená na setrvalé sledování pacientů těsně po zákroku.

Poté, co bude výkon ukončen, resp. až se proberete již k plnému vědomí, měli byste:

- se zeptat, zda se podařilo to, co bylo v plánu
- informovat lékařský personál o případných potížích
- zeptat se co můžete a nemůžete dělat
- položit všechny otázky, které máte na srdci a na cokoli se zeptat zdravotnických pracovníků a členů lékařského týmu

- zapamatovat si (a porozumět) proč byla operace provedena, jak dopadla a co bude následovat

Po úplném probrání z narkozy budete vyšetřeni službu konajícím anesteziologem, v případě souhlasného stanoviska můžete být propuštěni. Budete předán plnoletému doprovodu, který se zaručí, že Vám neumožní řízení motorových prostředků a obsluhu strojů.

Můžete pociťovat dyskomfort, resp. i lehkou bolestivost po několik dnů od operace – můžete použít běžné léky proti bolesti. Na ránu se aplikuje mast, aby se zabránilo přilepení k prádlu – doporučuje se nosit lehké prádlo po 2-3 dny. Od druhého dne po operaci se doporučují koupele ve vlažném roztoku výtažku z heřmánku nebo řepíku a po osušení aplikace masti (recept dostanete při odchodu z nemocnice). Samotné močení by nemělo být operací ovlivněno.

Jaká jsou pooperační rizika či komplikace?

Běžné (> 10% zákroků tohoto typu)

- Zvýšená citlivost až bolestivost v místě snesených lézí (hodiny až dny)

Výjimečné (2-10% zákroků tohoto typu)

- Infekce v místě operace vyžadující další léčbu.
- Krvácení z rány, vyžadující si případnou operační revizi

Vzácné (mohou nastat při <2 % zákroků tohoto typu)

- Opakovaný výskyt bradavic
- Změněná citlivost penisu

Co bych měl po návratu domů očekávat?

Při propuštění z nemocnice byste měli:

- Dostat doporučení ohledně domácí rekonvalescence
- Zeptat se, kdy se můžete vrátit k běžné aktivitě, jako je práce, cvičení, jízda v autě, domácí práce, sexuální aktivity
- Obdržet kontaktní číslo, pokud byste měli nějaké dotazy po návratu domů či potíže
- Zeptat se na termín a místo následující kontroly (nemocnice nebo váš ošetřující lékař)
- Ujistit se, že máte povědomí o důvodu, průběhu a výsledku operace, o výsledcích vyšetření či o odběru tkání nebo orgánů.

Při odchodu z nemocnice (někdy až s odstupem několika dní) dostanete zprávu o proběhlé hospitalizaci /operaci. Dokument obsahuje důležité informace o vašem pobytu v nemocnici, vaší operaci a doporučeném následném postupu, včetně eventuelního histologického nálezu. Pokud potřebujete z nějakého důvodu zavolat svému ošetřujícímu lékaři nebo navštívit nemocnici, vezměte si tento dokument s sebou, aby si mohl lékař prostudovat podrobnosti o vaší léčbě. Toto je obzvlášť důležité, pokud se potřebujete poradit s jiným lékařem či již déle po propuštění.

Bude trvat minimálně 10 dní, než bude pozorovatelné hojení – do práce se můžete vrátit, pokud se budete cítit dobře (záleží i na charakteru vaší práce). Minimálně 4 týdny byste se měli vyhnout sexuálnímu styku.

Na co ještě bych si měl dávat pozor?

Pokud se vyskytnou nejasné problémy, které mohou souviset s prodělaným zákrokem, navštivte svého ošetřujícího lékaře / urologa.

Je potřeba něco zdůraznit?

Do zhojení je vhodné lokálně aplikovat Framykoin mast. Většina pacientů potřebuje 1-2 dny domácího klidu. Do úplného zhojení doporučujeme zvýšenou hygienu genitálu.

Jak bych měl tyto informace využít?

Děkujeme, že jste si přečetli tento dokument. Pokud souhlasíte s naplánovaným postupem, je nutné podepsat formulář informovaného souhlasu, který zůstane uložen v nemocnici, jako součást chorobopisu. Máte právo na jednu kopii tohoto informovaného souhlasu.